

*DASCILLIDES ET HELODIDES NOUVEAUX [COL.],*

PAR M. M. PIC.

Les types des insectes faisant l'objet du présent article appartiennent au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris; des co-types de *Dascillus Cavaleriei* et *Scirtes* v. *Germaini* figurent dans la collection Pic.

**Paralichas piceiceps** nov. sp. ♀.

*Elongatus, nitidus, griseo aut luteo pubescens, rufus, infra corpore pedibusque pallidioribus, tibiis pro parte paulo brunneis, capite piceo. Capite breve, minute et dense punctato, oculis validis, prominulis; antennis rufis, articulo 2° breve, 3° elongato, apice dilatato et angulato, 4° et sequentibus plus minusve brevibus et dentatis (ullimis fractis); thorace breve et lato, antice valde attenuato, postice paulo dilatato, minute sat dense punctato; scutello grande, minute et densissime ruguloso-punctato; elytris thorace non latioribus, elongatis, apice attenuatis, minute sat dense punctatis, pro parte substriatis, ad humeros subrotundato impressis.*

Long. 10 millim. — Chine : Kouy-Tcheou (P. Cavalerie et Fortunat, 1906.)

Diffère, à première vue, de *P. Fortunei* White et voisins par le prothorax non marqué de noir.

**Epilichas vittaticollis** nov. sp.

*Elongatus, nitidus, luteo pubescens, niger, thorace, illo medio nigro villato, pectore, femoribus et tarsis apice testaceis. Capite minute et dense punctato; antennis fractis; thorace breve et lato, antice attenuato, minute sat dense punctato, supra transverse impresso; scutello grande, minute et dense ruguloso-punctato; elytris thorace indistincte latioribus, elongatis, apice attenuatis, minute sat dense punctatis, pro parte substriatis, nigris, ad basim et ad suturam rufo marginalis, ad humeros transverse impressis; abdomine fracto.*

Long. 10 millim. — Chine : Kouy-Tcheou (P. Cavalerie, 1910). Espèce distincte, à première vue, des autres du genre, par le prothorax bicolore, orné d'une bande médiane noire.

**Dascillus Cavaleriei** nov. sp.

*Oblongus, opacus, niger aut piccus, dense pubescens, supra luteo et infra corpore griseo pubescente, pedibus nigris, femoribus rufis. Antennis filiformibus; thorace breve et lato, antice attenuato, postice sinuato, angulis posticis fere rectis, medio sulcaluto; elytris thorace paulo latioribus, postice subdilatis, apice attenuatis, instrialis sed multi costulatis, sat fortiter sed indistincte punctatis.*

Long. 10-12 millim. — Chine : Kouy-Tcheou (P. Cavalerie, 1910). Par les élytres ayant de nombreuses petites costules paraît se rapprocher de *D. praestans* Fairm., il en diffère au moins par l'abdomen non maculé de foncé.

**Exochomoscirtes immaculatus** nov. sp.

*Late ovalus, valde convexus, nitidus, sparse griseo pubescens, niger, vage subacneus, abdomine pedibusque testaceis, elytris apice minute flavo notatis. Capite parum punctato; thorace breve et latissimo, antice paulo attenuato, lateraliter vage rufo marginato, minute et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, lateraliter arcuatis et marginalis, apice attenuatis, sat fortiter et dense punctatis; pedibus posticis validis, tibiis carinatis et paulo arcuatis.*

Long. 3 millim.; larg. 2 millim. — Bolivie : Cochabamba (P. Germain, in coll. Bourgeois).

Espèce des plus distinctes par sa coloration particulière, les élytres n'étant pas maculés de roux.

SCIRTES TESTACEICOLLIS V. NOV. **Germani.**

*Oblongu-ovalus, parum convexus, testaceus, elytris nigris, ad humeros testaceo maculatis, ad apicem et lateraliter postice testaceo notatis.*

Long. 3 millim. — Bolivie : Cochabamba (P. Germain).

Diffère de *S. boliviensis* Pic, par la taille plus grande, la tête concolore, les élytres non entièrement foncés.

**Scirtes Vassei** nov. sp.

*Oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-picens, pro parte brunneus, elytris testaceis, ad suturam piceo vittatis, villa antice ad basim prolongata, et lateraliter ad medium piceo notatis, membris testaceis, antennis apice brunneis, femoribus posticis pro parte paulo brunnescentibus. Capite thoracque minute et sparse punctatis, illo breve et lato, antice attenuato; scutello brunnescente, valido, triangulare, sat sparse punctato; elytris thorace parum latioribus, sat brevibus, postice attenuatis, minute et irregulariter punctatis; tibiis posticis paulo curvatis.*

Long. 3 millim. — Mozambique : prov. de Gorongosa, 1907 (G. Vasse).

Voisin de *S. Clermonti* Pic, en diffère par la forme plus allongée, les yeux moins gros, la tête moins distinctement et plus éparsément ponctuée.

**Stenactyla striata** nov. sp. ♀.

*Oblongo-elongata, antice et postice attenuata, nitida, griseo pubescens, rufo-brunnea, antennis ad basim, femoribus, tarsisque testaceis. Capite sat fortiter et parum dense punctato, oculis prominulis; antennis filiformibus, piceis, ad basim testaceis; thorace breve et lato, antice attenuato, postice lateraliter late explanato, mediocre sat sparse pupillato-punctato, antice convexo, postice depresso; elytris thorace paulo latioribus, postice subdilatis et apice attenuatis, pro parte fortiter striato-punctatis, striis diversis, pro parte reductis, intervallis sparse punctatis.*

Long. 4 millim. — Mozambique : environs d'Andrada, 1905 (G. Vasse).

Voisin de *S. Tangana* Pic, en diffère par les stries fortes et non régulières des élytres, la ponctuation du prothorax plutôt plus espacée sur les côtés que sur le disque, alors que celle-ci est, chez *S. tangana* Pic, espacée sur les côtés et dense sur le disque.

**Ptilodactyla discicollis** nov. sp. ♀.

*Elongata, subparallèle, parum griseo pubescens, nitida, nigra, scutello, pedibus, thorace lateraliter et elytris antice longe testaceis. Capite punctato, oculis valde prominulis; antennis nigris, sat crassis; thorace breve et lato, postice arcuate-dilatato, postice deplanato, minute et sparse punctato; scutello testacco, punctato; elytris thorace non latioribus, lateraliter subarcuatis et marginatis, apice attenuatis, minute et irregulariter punctatis, ad suturam striatis, his testaceis, apice late nigris et lateraliter antice pro parte nigro cinctis.*

Long. 4 millim. — Bolivie : Cochabamba (Germain).

Voisin de *P. discoidalis* Pic, moins robuste, prothorax moins large et largement foncé sur son milieu.